

Beispielaufgaben zum Thema **Vektoranalysis**

Aufgabe 8.1 Zeichnen Sie für das Skalarfeld $u(x, y)$ die Niveaukurven:

- a) $u(x, y) = x + y$,
- b) $u(x, y) = \frac{y}{x^2}, x \neq 0$,
- c) $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2), (x, y) \neq (0, 0)$,
- d) $u(x, y) = \arccos \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 1$.

Aufgabe 8.2 Berechnen Sie $\operatorname{div} f$ und $\operatorname{rot} f$ für das Vektorfeld f :

- a) $f(x, y, z) = (xy + z^2, yz + x^2, zx + y^2)$,
- b) $f(x, y, z) = (x - 3z, x + 2y + z, 4x + y)$,
- c) $f(x, y, z) = (xy^2, x^2y, z^3)$,
- d) $f(x, y, z) = (xyz, x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$,
- e) $f(x, y, z) = \operatorname{grad} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$,
- f) $f(x, y, z) = \operatorname{grad} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Aufgabe 8.3 Es seien $u = u(x, y, z)$ ein Skalarfeld und $f = (f_1, f_2, f_3)$ mit $f_1 = f_1(x, y, z)$, $f_2 = f_2(x, y, z)$, $f_3 = f_3(x, y, z)$ ein Vektorfeld. Beweisen Sie:

- a) $\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = (0, 0, 0)$,
- b) $\operatorname{div} \operatorname{rot} f = 0$,
- c) $\operatorname{rot} \operatorname{rot} f = \operatorname{grad} \operatorname{div} f - \Delta f$, wobei $\Delta f = (\Delta f_1, \Delta f_2, \Delta f_3)$.

Aufgabe 8.4 Entscheiden Sie, ob die folgenden Vektorfelder f quellfrei bzw. konservativ sind. Für konservative f berechnen Sie das Potential u mit $f = \operatorname{grad} u$.

- a) $f(x, y) = (y^2, xy)$,
- b) $f(x, y) = (2x, 2y)$,
- c) $f(x, y, z) = (2xy + z, x^2 - 2y, x)$,
- d) $f(x, y, z) = \left(yz - xy, xz - \frac{x^2}{2} + yz^2, xy + y^2z \right)$,
- e) $f(x, y, z) = (y, z, x)$,
- f) $f(x, y, z) = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$,
- g) $f(x, y, z) = \operatorname{grad} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$.