

Statistik für Informatiker, SS 2017

2. Ideen aus der Statistik

2.2 Schätzer und Tests für (Populations-)Mittelwerte

Matthias Birkner

<http://www.staff.uni-mainz.de/birkner/StatInfo17/>

28.6.2017



JOHANNES GUTENBERG
UNIVERSITÄT MAINZ

Eine „Standardsituation“ in der Statistik:

Wir haben n Beobachtungswerte x_1, \dots, x_n (z.B. die Carapaxlängen der gefangenen Springkrebse aus dem Einstiegsbeispiel zur deskriptiven Statistik)

Eine „Standardsituation“ in der Statistik:

Wir haben n Beobachtungswerte x_1, \dots, x_n (z.B. die Carapaxlängen der gefangenen Springkrebse aus dem Einstiegsbeispiel zur deskriptiven Statistik) und möchten anhand dessen etwas über die „Gesamtpopulation“, aus der die Daten stammen, aussagen.

Eine „Standardsituation“ in der Statistik:

Wir haben n Beobachtungswerte x_1, \dots, x_n (z.B. die Carapaxlängen der gefangenen Springkrebse aus dem Einstiegsbeispiel zur deskriptiven Statistik) und möchten anhand dessen etwas über die „Gesamtpopulation“, aus der die Daten stammen, aussagen.

Die grundlegende Idee: Die Daten werden als Realisierungen von Zufallsvariablen aufgefasst, die in einem stochastischen Modell spezifiziert werden.

Man versucht dann, anhand der Daten Rückschlüsse auf Parameter des Modells zu ziehen, und so systematische Effekte von Zufälligem zu trennen.

Wir formulieren dies folgendermaßen („abstrakt“): Ein *statistisches Modell* besteht aus einem Zufallsexperiment \mathcal{X} (d.h. einer Schar von Zufallsvariablen, die die möglichen Beobachtungswerte repräsentieren) zusammen mit einer Menge von Wahrscheinlichkeiten P_{ϑ} , $\vartheta \in \Theta$. (Θ kann eine recht allgemeine Indexmenge sein.)

Wir formulieren dies folgendermaßen („abstrakt“): Ein *statistisches Modell* besteht aus einem Zufallsexperiment \mathcal{X} (d.h. einer Schar von Zufallsvariablen, die die möglichen Beobachtungswerte repräsentieren) zusammen mit einer Menge von Wahrscheinlichkeiten P_{ϑ} , $\vartheta \in \Theta$. (Θ kann eine recht allgemeine Indexmenge sein.)

Die verschiedenen P_{ϑ} beschreiben unterschiedliche Arten, „wie der Zufall wirken kann“ (d.h. unterschiedliche Verteilungen der Zufallsvariablen in \mathcal{X}). Im Kontext des Modells nehmen wir an, dass die Daten gemäß einem gewissen P_{ϑ} generiert wurden, wir kennen aber das „wahre“ ϑ nicht.

Wir formulieren dies folgendermaßen („abstrakt“): Ein *statistisches Modell* besteht aus einem Zufallsexperiment \mathcal{X} (d.h. einer Schar von Zufallsvariablen, die die möglichen Beobachtungswerte repräsentieren) zusammen mit einer Menge von Wahrscheinlichkeiten P_{ϑ} , $\vartheta \in \Theta$. (Θ kann eine recht allgemeine Indexmenge sein.)

Die verschiedenen P_{ϑ} beschreiben unterschiedliche Arten, „wie der Zufall wirken kann“ (d.h. unterschiedliche Verteilungen der Zufallsvariablen in \mathcal{X}). Im Kontext des Modells nehmen wir an, dass die Daten gemäß einem gewissen P_{ϑ} generiert wurden, wir kennen aber das „wahre“ ϑ nicht.

Die Aufgabe der (schließenden) Statistik besteht grob gesprochen darin, anhand der Beobachtungen Informationen über das „zugrundeliegende“ ϑ zu gewinnen.

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

Lageschätzung

Modell: X_1, \dots, X_n unabhängige ZVn mit derselben Verteilung ϑ (die wir möglicherweise nicht kennen), mit Mittelwert $\mu (= \mu(\vartheta))$ und Varianz $\sigma^2 (= \sigma^2(\vartheta))$

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

\bar{X} ist ein *Schätzer* für μ .

Lageschätzung

Modell: X_1, \dots, X_n unabhängige ZVn mit derselben Verteilung ϑ (die wir möglicherweise nicht kennen), mit Mittelwert $\mu (= \mu(\vartheta))$ und Varianz $\sigma^2 (= \sigma^2(\vartheta))$

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

\bar{X} ist ein *Schätzer* für μ .

\bar{X} ist *erwartungstreu*:

$$\mathbb{E}_{\vartheta}[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{\vartheta}[X_i] = \mathbb{E}_{\vartheta}[X_1] = \mu = \mu(\vartheta) \quad \text{unter } P_{\vartheta},$$

egal, was der tatsächliche Wert von μ ist

Lageschätzung

X_1, \dots, X_n unabhängige ZVn mit derselben Verteilung, mit Mittelwert $\mu (= \mu(\vartheta))$ und Varianz $\sigma^2 (= \sigma^2(\vartheta))$

\bar{X} ist *konsistent*:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{stoch.}} \mu = \mu(\vartheta) \quad \text{unter } P_{\vartheta}$$

(gemäß dem Gesetz der großen Zahlen).

Lageschätzung

X_1, \dots, X_n unabhängige ZVn mit derselben Verteilung, mit Mittelwert $\mu (= \mu(\vartheta))$ und Varianz $\sigma^2 (= \sigma^2(\vartheta))$

\bar{X} ist *konsistent*:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{stoch.}} \mu = \mu(\vartheta) \quad \text{unter } P_{\vartheta}$$

(gemäß dem Gesetz der großen Zahlen).

Allgemein: Wir interessieren uns für eine gewisse (numerische) Eigenschaft $h(\vartheta)$ der Verteilung ϑ der X_i , eine Funktion Y der X_1, \dots, X_n ist ein erwartungstreuer Schätzer für $h(\vartheta)$, wenn stets gilt

$$\mathbb{E}_{\vartheta}[Y] = h(\vartheta)$$

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

(ist ein „Punktschätzer“ für $\mu = \mathbb{E}_{\vartheta}[X_i]$ mit „guten“ Eigenschaften)

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

(ist ein „Punktschätzer“ für $\mu = \mathbb{E}_{\vartheta}[X_i]$ mit „guten“ Eigenschaften)

Soweit, so schön, aber: wie genau ist die Schätzung?

$$\text{Es ist } \text{Var}_{\vartheta}[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}_{\vartheta}[X_i] = \frac{\sigma^2}{n}.$$

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

(ist ein „Punktschätzer“ für $\mu = \mathbb{E}_{\vartheta}[X_i]$ mit „guten“ Eigenschaften)

Soweit, so schön, aber: wie genau ist die Schätzung?

$$\text{Es ist } \text{Var}_{\vartheta}[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}_{\vartheta}[X_i] = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Wir machen zunächst „unser Leben leicht“:

Nehmen wir an, dass wir σ kennen, und dass die Daten aus einer Normalverteilung stammen (im Modell: X_i u.i.v., $\sim \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$).

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

Konfidenzintervall für den Mittelwert im normalen Modell bei bekannter Varianz

X_1, X_2, \dots, X_n u.i.v. $\sim \vartheta = \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ mit (uns unbekanntem) $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ sei bekannt (und fest).

Sei $\alpha \in (0, 1)$ [z.B. $\alpha = 0.05$ oder $\alpha = 0.01$],

$q := \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ das $(1 - \alpha/2)$ -Quantil der

Standardnormalverteilung [mit R : `qnorm(1 - $\alpha/2$)`].

Konfidenzintervall für den Mittelwert im normalen Modell bei bekannter Varianz

X_1, X_2, \dots, X_n u.i.v. $\sim \vartheta = \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ mit (uns unbekanntem) $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ sei bekannt (und fest).

Sei $\alpha \in (0, 1)$ [z.B. $\alpha = 0.05$ oder $\alpha = 0.01$],
 $q := \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ das $(1 - \alpha/2)$ -Quantil der
Standardnormalverteilung [mit $R : q_{\text{norm}}(1 - \alpha/2)$].

Das (anhand der Daten konstruierte) Intervall

$$I := \left[\bar{X} - q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Konfidenzintervall für den Mittelwert im normalen Modell bei bekannter Varianz

X_1, X_2, \dots, X_n u.i.v. $\sim \vartheta = \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ mit (uns unbekanntem) $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ sei bekannt (und fest).

Sei $\alpha \in (0, 1)$ [z.B. $\alpha = 0.05$ oder $\alpha = 0.01$],
 $q := \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ das $(1 - \alpha/2)$ -Quantil der Standardnormalverteilung [mit $R : q_{\text{norm}}(1 - \alpha/2)$].

Das (anhand der Daten konstruierte) Intervall

$$I := \left[\bar{X} - q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

hat die Eigenschaft

$$P_{\vartheta}(\mu \in I) = 1 - \alpha$$

(egal, was μ ist)

$$I := \left[\bar{X} - q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$P_{\vartheta}(\mu \in I) = 1 - \alpha$$

denn

$$\bar{X} - q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + q \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

\Leftrightarrow

$$-q \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq q$$

und (egal was μ und σ^2 sind) stets ist unter P_{ϑ}

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}_{0,1}$$

Konfidenzintervall

Allgemein heißt ein (anhand der Beobachtungswerte zu konstruierendes) Intervall I ein *Konfidenzintervall* (manchmal auch „Vertrauensintervall“) für μ zum (Sicherheits-)Niveau $1 - \alpha$ (bzw. Irrtumsniveau α), wenn gilt

$$\forall \vartheta \in \Theta : P_{\vartheta}(\mu \in I) \geq 1 - \alpha.$$

(mit Notation $\mu = \mu(\vartheta)$).

Konfidenzintervall

Allgemein heißt ein (anhand der Beobachtungswerte zu konstruierendes) Intervall I ein *Konfidenzintervall* (manchmal auch „Vertrauensintervall“) für μ zum (Sicherheits-)Niveau $1 - \alpha$ (bzw. Irrtumsniveau α), wenn gilt

$$\forall \vartheta \in \Theta : P_{\vartheta}(\mu \in I) \geq 1 - \alpha.$$

(mit Notation $\mu = \mu(\vartheta)$).

Beachte: I ist zufällig, nicht aber ϑ (zumindest in unserer (sogenannten frequentistischen) Interpretation).

Konfidenzintervall

Allgemein heißt ein (anhand der Beobachtungswerte zu konstruierendes) Intervall I ein *Konfidenzintervall* (manchmal auch „Vertrauensintervall“) für μ zum (Sicherheits-)Niveau $1 - \alpha$ (bzw. Irrtumsniveau α), wenn gilt

$$\forall \vartheta \in \Theta : P_{\vartheta}(\mu \in I) \geq 1 - \alpha.$$

(mit Notation $\mu = \mu(\vartheta)$).

Beachte: I ist zufällig, nicht aber ϑ (zumindest in unserer (sogenannten frequentistischen) Interpretation).

Offenbar möchte man i.A. I so kurz wie möglich wählen (soweit verträglich mit dem geforderten Niveau).

Bemerkung. Auch wenn die X_i nicht wörtlich normalverteilt sind (sondern unabhängig und identisch verteilt mit einer gewissen Verteilung ϑ , die Mittelwert μ und Varianz σ^2 hat), so ist

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \stackrel{d}{\approx} \mathcal{N}_{0,1}$$

gemäß dem zentralen Grenzwertsatz.

Bemerkung. Auch wenn die X_i nicht wörtlich normalverteilt sind (sondern unabhängig und identisch verteilt mit einer gewissen Verteilung ϑ , die Mittelwert μ und Varianz σ^2 hat), so ist

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \stackrel{d}{\approx} \mathcal{N}_{0,1}$$

gemäß dem zentralen Grenzwertsatz.

Daher ist auch für allgemeine Verteilung das auf Normalität fußende Konfidenzintervall zumindest für große n „approximativ korrekt“

Bemerkung. Auch wenn die X_i nicht wörtlich normalverteilt sind (sondern unabhängig und identisch verteilt mit einer gewissen Verteilung ϑ , die Mittelwert μ und Varianz σ^2 hat), so ist

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \stackrel{d}{\approx} \mathcal{N}_{0,1}$$

gemäß dem zentralen Grenzwertsatz.

Daher ist auch für allgemeine Verteilung das auf Normalität fußende Konfidenzintervall zumindest für große n „approximativ korrekt“

(man muss aber σ kennen, um es zu konstruieren).

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz

- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

Wenn man die Varianz nicht kennt ...

Wenn man die Varianz nicht kennt ...

... kann man sie immerhin schätzen:

$$S^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

[im Sinne der deskriptiven Statistik wäre dies die „korrigierte Stichprobenvarianz“]

Wenn man die Varianz nicht kennt ...

... kann man sie immerhin schätzen:

$$S^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

[im Sinne der deskriptiven Statistik wäre dies die „korrigierte Stichprobenvarianz“]

ist erwartungstreuer Schätzer für σ^2 :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_\vartheta \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] &= n \mathbb{E}_\vartheta \left[(X_i - \bar{X})^2 \right] = n \text{Var}_\vartheta [X_i - \bar{X}] \\ &= n \text{Var}_\vartheta \left[\frac{n-1}{n} X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i \right] \\ &= n \left(\left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \text{Var}_\vartheta [X_1] + \frac{n-1}{n^2} \text{Var}_\vartheta [X_1] \right) = (n-1) \text{Var}_\vartheta [X_1] = (n-1) \sigma^2 \end{aligned}$$

S^2 ist konsistent (als Folge in n betrachtet):

$$\begin{aligned}\frac{n-1}{n} S^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \bar{X} \right) + (\bar{X})^2 \\ &= \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - (\bar{X})^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{stoch.}} \mathbb{E}_{\vartheta} [X_1^2] - (\mathbb{E}_{\vartheta} [X_1])^2 = \sigma^2\end{aligned}$$

(verwende jeweils das Gesetz der großen Zahlen).

S^2 ist konsistent (als Folge in n betrachtet):

$$\begin{aligned}\frac{n-1}{n} S^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \bar{X} \right) + (\bar{X})^2 \\ &= \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - (\bar{X})^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{stoch.}} \mathbb{E}_{\vartheta} [X_1^2] - (\mathbb{E}_{\vartheta} [X_1])^2 = \sigma^2\end{aligned}$$

(verwende jeweils das Gesetz der großen Zahlen).

Wir wissen bereits: Die Standardabweichung von \bar{X} ist $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

S^2 ist konsistent (als Folge in n betrachtet):

$$\begin{aligned}\frac{n-1}{n} S^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \bar{X} \right) + (\bar{X})^2 \\ &= \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - (\bar{X})^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{stoch.}} \mathbb{E}_{\vartheta} [X_1^2] - (\mathbb{E}_{\vartheta} [X_1])^2 = \sigma^2\end{aligned}$$

(verwende jeweils das Gesetz der großen Zahlen).

Wir wissen bereits: Die Standardabweichung von \bar{X} ist $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Somit ist

$$\frac{S}{\sqrt{n}}$$

ein (naheliegender) Schätzer für die (unbekannte) Standardabweichung von \bar{X}

S^2 ist konsistent (als Folge in n betrachtet):

$$\begin{aligned}\frac{n-1}{n} S^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \bar{X} \right) + (\bar{X})^2 \\ &= \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - (\bar{X})^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{stoch.}} \mathbb{E}_{\vartheta} [X_1^2] - (\mathbb{E}_{\vartheta} [X_1])^2 = \sigma^2\end{aligned}$$

(verwende jeweils das Gesetz der großen Zahlen).

Wir wissen bereits: Die Standardabweichung von \bar{X} ist $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Somit ist

$$\frac{S}{\sqrt{n}}$$

ein (naheliegender) Schätzer für die (unbekannte) Standardabweichung von \bar{X} ,

man nennt es auch den *Standardfehler*.

Satz (Student (=William Gosset), 1908). X_1, \dots, X_n u.i.v.
 $\sim \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ mit $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$,

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$


Dann besitzt $T := \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{S^2}}$ die Dichte $t_{n-1}(x)$, wobei

$$t_m(x) = \frac{\Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{m}{2})} \frac{1}{\sqrt{m}} \left(1 + \frac{x^2}{m}\right)^{-\frac{m+1}{2}}$$


t_m ist die Dichte der *Student-t-Verteilung* mit m Freiheitsgraden

(manchmal auch Student-Verteilung oder t -Verteilung genannt).


Dichte der t-Verteilung




Dichte der t-Verteilung



Dichte der t-Verteilung



Dichte der t-Verteilung



Bemerkung.

Die t -Verteilung wurde von William Gosset erforscht und von ihm 1908 veröffentlicht, während er in einer Guinness-Brauerei arbeitete. Da sein Arbeitgeber die Veröffentlichung nicht gestattete, veröffentlichte Gosset sie unter dem Pseudonym *Student*.

Bemerkung.

Die t -Verteilung wurde von William Gosset erforscht und von ihm 1908 veröffentlicht, während er in einer Guinness-Brauerei arbeitete. Da sein Arbeitgeber die Veröffentlichung nicht gestattete, veröffentlichte Gosset sie unter dem Pseudonym *Student*.

Beweise finden sich in der Literatur, siehe z.B. Kersting & Wakolbinger, Kap.22 oder Georgii, Satz 9.17

(Es gibt dazu ein schönes geometrisches Argument, das die Rotationsinvarianz der multivariaten Normalverteilung ausnutzt.)

Freiheitsgrade?

Beispiel: Es gibt 5 Freiheitsgrade im Vektor

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

da 5 Werte frei wählbar sind. Der Vektor

$$v := x - \bar{x} := (x_1 - \bar{x}, x_2 - \bar{x}, x_3 - \bar{x}, x_4 - \bar{x}, x_5 - \bar{x})$$

hat 4 Freiheitsgrade, denn nach Wahl von v_1, v_2, v_3, v_4 ist v_5 festgelegt wegen $v_1 + \dots + v_4 + v_5 = 0$.

Freiheitsgrade?

Beispiel: Es gibt 5 Freiheitsgrade im Vektor

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

da 5 Werte frei wählbar sind. Der Vektor

$$v := x - \bar{x} := (x_1 - \bar{x}, x_2 - \bar{x}, x_3 - \bar{x}, x_4 - \bar{x}, x_5 - \bar{x})$$

hat 4 Freiheitsgrade, denn nach Wahl von v_1, v_2, v_3, v_4 ist v_5 festgelegt wegen $v_1 + \dots + v_4 + v_5 = 0$.

Die Bezeichnung „Student-Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden“ ist motiviert durch die Tatsache, dass $t = (\bar{x} - \mu) / (s / \sqrt{n})$, wo

$$s = \sqrt{s^2} = \frac{1}{\sqrt{n-1}} \left((x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2 \right)^{1/2}$$

(bis auf Normierung) die Länge eines „Vektors mit $n - 1$ Freiheitsgraden“ ist.

Student-Konfidenzintervall für den Erwartungswert im normalen Modell

Unter P_{ϑ} , $\vartheta = (\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times (0, \infty)$ seien

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ u.i.v. } \sim \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}.$$

Sei $\alpha \in (0, 1)$, $q = q_{n-1, 1-\alpha/2}$ das $1 - \frac{\alpha}{2}$ -Quantil der Student-Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden

[mit $R : \text{qt}(1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$],

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Dann ist

$$I := \left[\bar{X} - q \sqrt{\frac{S^2}{n}}, \bar{X} + q \sqrt{\frac{S^2}{n}} \right]$$

ein Konfidenzintervall für μ zum Irrtumsniveau α .

$$I := \left[\bar{X} - q \sqrt{\frac{S^2}{n}}, \bar{X} + q \sqrt{\frac{S^2}{n}} \right]$$

ist ein Konfidenzintervall für μ zum Irrtumsniveau α

$$I := \left[\bar{X} - q\sqrt{\frac{S^2}{n}}, \bar{X} + q\sqrt{\frac{S^2}{n}} \right]$$

ist ein Konfidenzintervall für μ zum Irrtumsniveau α ,

denn $T := \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sqrt{S^2}}$ ist Student-verteilt mit $n-1$

Freiheitsgraden (für jede Wahl von μ und σ^2), also

$$P_{(\mu, \sigma^2)} \left(\bar{X} - q\sqrt{\frac{S^2}{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + q\sqrt{\frac{S^2}{n}} \right)$$

$$= P(-q \leq T \leq q) = P(T \leq q) - P(T \leq -q) = 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha.$$

Beispiel. 10 Patienten erhielten in aufeinanderfolgenden Nächten Schlafmittel A, dann Mittel B.

Die Daten¹ (x_i = Anz. Stunden Schlaf mit Mittel A - Anz. Stunden Schlaf mit Mittel B bei Patient Nr. i):

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	1,2	2,4	1,3	1,3	0,0	1,0	1,8	0,8	4,6	1,4

¹Aus Student (William S. Gosset), The Probable Error of a Mean, Biometrika 6:1–25 (1908)

Beispiel. 10 Patienten erhielten in aufeinanderfolgenden Nächten Schlafmittel A, dann Mittel B.

Die Daten¹ (x_i = Anz. Stunden Schlaf mit Mittel A - Anz. Stunden Schlaf mit Mittel B bei Patient Nr. i):

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	1,2	2,4	1,3	1,3	0,0	1,0	1,8	0,8	4,6	1,4

Es ist

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i \approx 1,58, \quad s = \left(\frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 \right)^{1/2} \approx 1,23.$$

¹Aus Student (William S. Gosset), The Probable Error of a Mean, Biometrika 6:1–25 (1908)

$$\bar{x} \approx 1,58, \quad s \approx 1,23$$

Es ist $q_{9,0,995} \approx 3,25$ (aus einer Quantiltabelle oder beispielsweise mit R berechnet), demnach ist

$$\left[\bar{x} \pm q \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \approx [0,31, 2,85]$$

ein Konfidenzintervall für μ (die mittlere zusätzliche Anzahl Stunden Schlaf, die Medikament A mehr bringt als Medikament B) zum Sicherheitsniveau $0,99 = 1 - 0,01$.

$$\bar{x} \approx 1,58, \quad s \approx 1,23$$

Es ist $q_{9,0,995} \approx 3,25$ (aus einer Quantiltabelle oder beispielsweise mit R berechnet), demnach ist

$$\left[\bar{x} \pm q \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \approx [0,31, 2,85]$$

ein Konfidenzintervall für μ (die mittlere zusätzliche Anzahl Stunden Schlaf, die Medikament A mehr bringt als Medikament B) zum Sicherheitsniveau $0,99 = 1 - 0,01$.

Beachte: (Sinnlos) genaue Werte mit Rechnergenauigkeit sind $\bar{x} - q \frac{s}{\sqrt{n}} \approx 0,3159481$, $\bar{x} + q \frac{s}{\sqrt{n}} \approx 2,8440519$, man sollte allerdings die Grenzen eines Konfidenzintervalls stets „konservativ“, d.h. nach außen, runden.

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - **Abstrakter Rahmen**
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

Die Fragestellung statistischer Tests

Sei $(\mathcal{X}, (P_\vartheta)_{\vartheta \in \Theta})$ ein statistisches Modell, $\Theta = \Theta_0 \dot{\cup} \Theta_1$ disjunkte Zerlegung in „Nullhypothese“ und „Alternative“ (auch „Gegenhypothese“).

Die Fragestellung statistischer Tests

Sei $(\mathcal{X}, (P_{\vartheta})_{\vartheta \in \Theta})$ ein statistisches Modell, $\Theta = \Theta_0 \dot{\cup} \Theta_1$ disjunkte Zerlegung in „Nullhypothese“ und „Alternative“ (auch „Gegenhypothese“).

Wir suchen ein Verfahren, um anhand von Beobachtungswerten x_1, \dots, x_n zu entscheiden, ob wir

$H_0 : \vartheta \in \Theta_0$ (die Nullhypothese) oder

$H_1 : \vartheta \in \Theta_1$ (die Alternative)

für plausibler halten (und zugleich eine geeignete Art, „plausibler“ zu quantifizieren).

Die Fragestellung statistischer Tests

Abstrakt ist ein statistischer Test von Θ_0 gegen Θ_1 eine Funktion $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ der Beobachtungen mit Werten $\{0, 1\}$ und der Entscheidungsregel:

$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$ dann entscheide für H_0
(„behalte die Nullhypothese bei“)

$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 1$ dann entscheide für H_1
(„verwirf die Nullhypothese zugunsten der Alternative“)

Die Fragestellung statistischer Tests

Abstrakt ist ein statistischer Test von Θ_0 gegen Θ_1 eine Funktion $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ der Beobachtungen mit Werten $\{0, 1\}$ und der Entscheidungsregel:

$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$ dann entscheide für H_0
(„behalte die Nullhypothese bei“)

$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 1$ dann entscheide für H_1
(„verwirf die Nullhypothese zugunsten der Alternative“)

Sei $\alpha \in (0, 1)$. Der Test φ hat *Niveau* α , wenn gilt

$$\sup_{\vartheta \in \Theta_0} P_{\vartheta}(\varphi(X_1, \dots, X_n) = 1) \leq \alpha$$

(d.h. die W'keit für einen „Fehler 1. Art“ (die Nullhypothese fälschlicherweise zu verwerfen) ist $\leq \alpha$)

Die Fragestellung statistischer Tests

Zugleich ist wünschenswert:

$$P_{\vartheta}(\varphi(X_1, \dots, X_n) = 0) \stackrel{!}{=} \text{möglichst klein} \quad \text{für } \vartheta \in \Theta_1,$$

die W'keit für einen „Fehler 2. Art“ (die Nullhypothese fälschlicherweise zu akzeptieren) sollte klein sein.

Dann hat φ große „Schärfe“ oder „Macht“.

Statistischer Tests: Niveau vs. p -Wert

In der Praxis haben Tests meist die folgende Form:

Berechne eine gewisse (Test-)Statistik $Y = Y(x_1, \dots, x_n)$,
setze $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{1}(Y(x_1, \dots, x_n) > q)$ für einen
gewissen Wert $q = q(\alpha)$, der in Abhängigkeit von den
Parametern des Tests gewählt wird.

Statistischer Tests: Niveau vs. p -Wert

In der Praxis haben Tests meist die folgende Form:

Berechne eine gewisse (Test-)Statistik $Y = Y(x_1, \dots, x_n)$,
setze $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{1}(Y(x_1, \dots, x_n) > q)$ für einen
gewissen Wert $q = q(\alpha)$, der in Abhängigkeit von den
Parametern des Tests gewählt wird.

Sei $y = Y(x_1, \dots, x_n)$ beobachtet worden. Dann nennt man
(speziell wenn $\Theta_0 = \{\vartheta_0\}$)

$$P_{\vartheta_0}(Y(X_1, \dots, X_n) > y)$$

den p -Wert des Test(ergebnisses).

Statistischer Tests: Niveau vs. p -Wert

In der Praxis haben Tests meist die folgende Form:

Berechne eine gewisse (Test-)Statistik $Y = Y(x_1, \dots, x_n)$,
setze $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{1}(Y(x_1, \dots, x_n) > q)$ für einen
gewissen Wert $q = q(\alpha)$, der in Abhängigkeit von den
Parametern des Tests gewählt wird.

Sei $y = Y(x_1, \dots, x_n)$ beobachtet worden. Dann nennt man
(speziell wenn $\Theta_0 = \{\vartheta_0\}$)

$$P_{\vartheta_0}(Y(X_1, \dots, X_n) > y)$$

den p -Wert des Test(ergebnisses).

Dies ist die W'keit, bei Gültigkeit der Nullhypothese einen
mindestens so „extremen“ Wert der Teststatistik zu finden
wie den tatsächlich anhand der Daten beobachteten.

Statistischer Tests: Niveau vs. p -Wert

In der Praxis haben Tests meist die folgende Form:

Berechne eine gewisse (Test-)Statistik $Y = Y(x_1, \dots, x_n)$,
setze $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{1}(Y(x_1, \dots, x_n) > q)$ für einen
gewissen Wert $q = q(\alpha)$, der in Abhängigkeit von den
Parametern des Tests gewählt wird.

Sei $y = Y(x_1, \dots, x_n)$ beobachtet worden. Dann nennt man
(speziell wenn $\Theta_0 = \{\vartheta_0\}$)

$$P_{\vartheta_0}(Y(X_1, \dots, X_n) > y)$$

den p -Wert des Test(ergebnisses).

Dies ist die W'keit, bei Gültigkeit der Nullhypothese einen
mindestens so „extremen“ Wert der Teststatistik zu finden
wie den tatsächlich anhand der Daten beobachteten.

(Es gilt: Test lehnt H_0 zum Niveau α ab g.d.w. p -Wert $\leq \alpha$.)

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

ein Stichproben- t -Test

Modell: n u.i.v. Beobachtungen X_1, \dots, X_n , $X_i \sim \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$, $\mu \in \mathbb{R}$
und $\sigma^2 > 0$ unbekannt.

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (X_i - \bar{X})^2$$

Wir wissen: Für jedes $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ ist unter $P_{(\mu_0, \sigma^2)}$

$$T := \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S^2}} \sim \text{Student-}(n-1)$$

ein Stichproben- t -Test

Modell: n u.i.v. Beobachtungen X_1, \dots, X_n , $X_i \sim \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$, $\mu \in \mathbb{R}$
und $\sigma^2 > 0$ unbekannt.

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (X_i - \bar{X})^2$$

Wir wissen: Für jedes $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ ist unter $P_{(\mu_0, \sigma^2)}$

$$T := \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S^2}} \sim \text{Student-}(n-1)$$

Signifikanzniveau $\alpha \in (0, 1)$:

Zweiseitiger Test von $H_0 : \{\mu = \mu_0\}$ gegen $H_1 : \{\mu \neq \mu_0\}$:

Lehne H_0 ab, wenn $|T| > q_{n-1, 1-\alpha/2}$, wobei $q_{n-1, 1-\alpha/2} =$
 $(1 - \alpha/2)$ -Quantil der Student- $(n-1)$ -Vert.

Einseitiger Test von $H_0 : \{\mu \leq \mu_0\}$ gegen $H_1 : \{\mu > \mu_0\}$:

Lehne H_0 ab, wenn $T > q_{n-1, 1-\alpha}$, wobei $q_{n-1, 1-\alpha} =$
 $(1 - \alpha)$ -Quantil der Student- $(n-1)$ -Vert.

Beispiel:

Die Wirksamkeit eines gewissen Schlafmittels soll geprüft werden.

10 Patienten erhalten das Schlafmittel, die Anzahl zusätzlicher Stunden Schlaf wird in einer Nacht beobachtet.

Wir nehmen an, die Beob. sind u.i.v. $\sim \mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ und wir möchten die Nullhypothese $\mu = 0$, sagen wir, zum Niveau $\alpha = 0.05$ testen.

Die Daten*

Patient i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zus. Schl.	0.7	-1.6	-0.2	-1.2	-0.1	3.4	3.7	0.8	0.0	2.0

Es ist $n = 10$, $\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 0.75$,

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 \approx 1.79, \quad t = \frac{\bar{x} - 0}{s/\sqrt{10}} \approx 1.326$$

Das 0.975-Quantil der Student-9-Verteilung ist ≈ 2.262 , demnach können wir die Nullhypothese nicht ablehnen.

(Für ein Student-9-verteilttes T ist $P(|T| \geq 1.326) \approx 0.2176$, dies ist der p -Wert des Tests.)

* Aus Student (William S. Gosset), The Probable Error of a Mean, Biometrika 6:1–25 (1908)

Man kann unseren Befund folgendermaßen formulieren:

„Die Beobachtungen sind mit der Nullhypothese $\mu = 0$ (im statistischen Sinne) verträglich.“

oder

„Die beobachtete Abweichung $\bar{x} = 0.75$ ist nicht signifikant von 0 verschieden (t -Test, $\alpha = 0.05$).“

Das Beispiel in R:

```
> schlaf <- c(0.7, -1.6, -0.2, -1.2, -0.1, 3.4,  
             3.7, 0.8, 0.0, 2.0)  
> t.test(schlaf)
```

One Sample t -test

```
data: schlaf  
t = 1.3257, df = 9, p-value = 0.2176  
alternative hypothesis: true mean is not equal  
95 percent confidence interval:  
 -0.5297804  2.0297804  
sample estimates:  
mean of x  
 0.75
```

Beispiel:

Die Wirksamkeit eines Schlafmittels soll mit der eines anderen verglichen werden

10 Patienten erhalten Schlafmittel A , die Anzahl zusätzlicher Stunden Schlaf wird in einer Nacht beobachtet.

Dann erhalten dieselben 10 Patienten Schlafmittel B , wieder wird die Anzahl zusätzlicher Stunden Schlaf wird in einer Nacht beobachtet.

Da dieselben Patienten untersucht werden, können (und sollten) wir die Messungen paaren:

Wir interessieren uns bei jedem Patienten für die Differenz des (zusätzlichen) Schlafs bei Mittel B und bei Mittel A .

Wir nehmen an, die beobachteten Differenzen sind Realisierungen von u.i.v. ZVn mit Vert. $\mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ und wir möchten die Nullhypothese $\mu \leq 0$ gegen die Alternative $\mu > 0$, sagen wir, zum Niveau $\alpha = 0.05$ testen.

Wir nehmen an, die beobachteten Differenzen sind Realisierungen von u.i.v. ZVn mit Vert. $\mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ und wir möchten die Nullhypothese $\mu \leq 0$ gegen die Alternative $\mu > 0$, sagen wir, zum Niveau $\alpha = 0.05$ testen.

Dies wäre beispielsweise in folgender Situation angemessen:

Wir möchten darlegen, dass Mittel B wirksamer ist als Mittel A , indem wir die Nullhypothese „ $\mu \leq 0$ “ entkräften.

Wir nehmen an, die beobachteten Differenzen sind Realisierungen von u.i.v. ZVn mit Vert. $\mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$ und wir möchten die Nullhypothese $\mu \leq 0$ gegen die Alternative $\mu > 0$, sagen wir, zum Niveau $\alpha = 0.05$ testen.

Dies wäre beispielsweise in folgender Situation angemessen:

Wir möchten darlegen, dass Mittel B wirksamer ist als Mittel A , indem wir die Nullhypothese „ $\mu \leq 0$ “ entkräften.

Die Daten*

Patient i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mittel A	0.7	-1.6	-0.2	-1.2	-0.1	3.4	3.7	0.8	0.0	2.0
Mittel B	1.9	0.8	1.1	0.1	-0.1	4.4	5.5	1.6	4.6	3.4
Diff.	1.2	2.4	1.3	1.3	0.0	1.0	1.8	0.8	4.6	1.4

* Aus Student (William S. Gosset), The Probable Error of a Mean, Biometrika 6:1–25 (1908)

Patient i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diff.	1.2	2.4	1.3	1.3	0.0	1.0	1.8	0.8	4.6	1.4

Es ist $n = 10$, $\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1.58$,

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 \approx 1.23, \quad t = \frac{\bar{x} - 0}{s/\sqrt{10}} \approx 4.062$$

Das 0.95-Quantil der Student-9-Verteilung ist ≈ 1.833 ,
demnach können wir die Nullhypothese ablehnen.

(Für ein Student-9-verteilttes T ist $P(T > 4.062) \approx 0.0014$,
dies ist der p -Wert des Tests.)

Patient i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diff.	1.2	2.4	1.3	1.3	0.0	1.0	1.8	0.8	4.6	1.4

$$\text{Es ist } n = 10, \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1.58,$$

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 \approx 1.23, t = \frac{\bar{x} - 0}{s/\sqrt{10}} \approx 4.062$$

Das 0.95-Quantil der Student-9-Verteilung ist ≈ 1.833 , demnach können wir die Nullhypothese ablehnen.

(Für ein Student-9-verteilttes T ist $P(T > 4.062) \approx 0.0014$, dies ist der p -Wert des Tests.)

Mögliche knappe Formulierung:

„Die beobachtete Differenz $\bar{x} = 1.58$ ist signifikant größer als 0 (einseitiger t -Test, $\alpha = 0.05$).“

Das Beispiel in R:

```
> diff <- c(1.2, 2.4, 1.3, 1.3, 0.0, 1.0, 1.8,  
            0.8, 4.6, 1.4)  
> t.test(diff, alternative="greater")
```

One Sample t -test

```
data: diff  
t = 4.0621, df = 9, p-value = 0.001416  
alternative hypothesis: true mean is greater than  
95 percent confidence interval:  
 0.8669947          Inf  
sample estimates:  
mean of x  
 1.58
```

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

ungepaarter t -Test: Modell

m u.i.v. Beobachtungen X_1, \dots, X_m und davon unabhängig

n u.i.v. Beobachtungen Y_1, \dots, Y_n , unter P_{ϑ}

$X_i \sim \mathcal{N}_{\mu_1, \sigma^2}$, $Y_j \sim \mathcal{N}_{\mu_2, \sigma^2}$ mit $\vartheta = (\mu_1, \mu_2, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times (0, \infty)$

Seien

$$\bar{X} := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad \bar{Y} := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

$$S_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2,$$

ungepaarter t -Test: Modell

m u.i.v. Beobachtungen X_1, \dots, X_m und davon unabhängig
 n u.i.v. Beobachtungen Y_1, \dots, Y_n , unter P_{ϑ}

$X_i \sim \mathcal{N}_{\mu_1, \sigma^2}$, $Y_j \sim \mathcal{N}_{\mu_2, \sigma^2}$ mit $\vartheta = (\mu_1, \mu_2, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times (0, \infty)$

Seien
$$\bar{X} := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad \bar{Y} := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

$$S_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2,$$

$$S^2 := \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2} \left(= \frac{1}{m+n-2} \left(\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2 \right) \right),$$

(bem.: $\mathbb{E}_{(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)}[S^2] = \sigma^2$)

ungepaarter t -Test: Modell

m u.i.v. Beobachtungen X_1, \dots, X_m und davon unabhängig
 n u.i.v. Beobachtungen Y_1, \dots, Y_n , unter P_{ϑ}

$X_i \sim \mathcal{N}_{\mu_1, \sigma^2}$, $Y_j \sim \mathcal{N}_{\mu_2, \sigma^2}$ mit $\vartheta = (\mu_1, \mu_2, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times (0, \infty)$

Seien

$$\bar{X} := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad \bar{Y} := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

$$S_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2,$$

$$S^2 := \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2} \left(= \frac{1}{m+n-2} \left(\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2 \right) \right),$$

(bem.: $\mathbb{E}_{(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)}[S^2] = \sigma^2$)

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}.$$

Für $\mu_0 \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ ist unter $P_{(\mu_0, \mu_0, \sigma^2)}$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim \text{Student-}(m + n - 2)$$

Signifikanzniveau $\alpha \in (0, 1)$:

Zweiseitiger Test von $H_0 : \{\mu_1 = \mu_2\}$ gegen $H_1 : \{\mu_1 \neq \mu_2\}$:
Lehne H_0 ab, wenn $|T| > q_{m+n-2, 1-\alpha/2}$, wobei $q_{m+n-2, 1-\alpha/2} =$
 $(1 - \alpha/2)$ -Quantil der Student- $(n - 1)$ -Vert.

Einseitiger Test von $H_0 : \{\mu_1 \leq \mu_2\}$ gegen $H_1 : \{\mu_1 > \mu_2\}$:
Lehne H_0 ab, wenn $T > q_{m+n-2, 1-\alpha}$, wobei $q_{m+n-2, 1-\alpha} =$
 $(1 - \alpha)$ -Quantil der Student- $(n - 1)$ -Vert.


Beispiel: Es wurden fossile Backenzähne gefunden, die zwei Arten von Urpferden zugeordnet wurden, und jeweils die („mesiodistale“) Länge bestimmt.

Wir möchten die (Null-)Hypothese prüfen, ob die mittlere Zahnlänge bei den beiden Arten gleich ist.

Beispiel: Es wurden fossile Backenzähne gefunden, die zwei Arten von Urpferden zugeordnet wurden, und jeweils die („mesiodistale“) Länge bestimmt.

Wir möchten die (Null-)Hypothese prüfen, ob die mittlere Zahnlänge bei den beiden Arten gleich ist.

Die Daten



Hipparion
africanum

$$n_A = 39$$

$$\bar{x}_A = 25.9$$

$$s_A = 2.2$$

Hipparion lybicum

$$n_L = 38$$

$$\bar{x}_L = 28.4$$

$$s_L = 4.3$$

mesiodistale Länge [mm]

Wir verwenden Signifikanzniveau $\alpha = 0.01$, das 99,5%-Quantil der Student-Vert. mit 75 Freiheitsgraden ist ≈ 2.64 .

Es ist

$$s^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_L - 1)s_L^2}{n_A + n_L - 1} \approx 11.94, \quad t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_L}{s\sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_L}}} \approx -3.229,$$

Wir können die Nullhypothese „die mittlere mesiodistale Länge bei *H. lybicum* und bei *H. africanum* sind gleich“ zum Signifikanzniveau 1% ablehnen.

(Für ein Student-75-verteiltetes T ist $P(|T| > 3.229) \approx 0.0018$, dies ist der p -Wert des Tests.)

Wir verwenden Signifikanzniveau $\alpha = 0.01$, das 99,5%-Quantil der Student-Vert. mit 75 Freiheitsgraden ist ≈ 2.64 .

Es ist

$$s^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_L - 1)s_L^2}{n_A + n_L - 1} \approx 11.94, \quad t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_L}{s\sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_L}}} \approx -3.229,$$

Wir können die Nullhypothese „die mittlere mesiodistale Länge bei *H. lybicum* und bei *H. africanum* sind gleich“ zum Signifikanzniveau 1% ablehnen.

(Für ein Student-75-verteiltetes T ist $P(|T| > 3.229) \approx 0.0018$, dies ist der p -Wert des Tests.)

Mögliche Formulierung unseres Befunds:

„Die mittlere mesiodistale Länge war signifikant größer (28.4 mm) bei *H. libyicum* als bei *H. africanum* (25.9 mm) (t -Test, $\alpha = 0,01$).“

Das Beispiel in R:

```
> t.test(md[Art=="africanum"],md[Art=="libycum"]  
        var.equal=TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data: md[Art == "africanum"] and md[Art == "li  
t = -3.2289, df = 75, p-value = 0.001845  
alternative hypothesis:  
true difference in means is not equal to 0  
95 percent confidence interval:  
 -4.0811448 -0.9667634  
sample estimates:  
mean of x mean of y  
 25.91026  28.43421
```

Betrachten wir (spaßeshalber) nochmal die Schlafmittel-Daten, diesmal ungepaart:

```
> medA <- c(0.7, -1.6, -0.2, -1.2, -0.1, 3.4, 3.7, 0.8, 0.0)
> medB <- c(1.9, 0.8, 1.1, 0.1, -0.1, 4.4, 5.5, 1.6, 4.6, 3.0)
> t.test(medB, medA, var.equal=TRUE)
```

Two Sample t -test

```
data: medB and medA
t = 1.8608, df = 18, p-value = 0.07919
alternative hypothesis: true difference in mean
95 percent confidence interval:
 -0.203874  3.363874
sample estimates:
mean of x mean of y
      2.33      0.75
```

Inhalt

- 1 Schätzer und Konfidenzintervall
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervall, bekannte Varianz
 - Konfidenzintervall, unbekannte Varianz
- 2 Statistische Tests
 - Abstrakter Rahmen
 - ein Stichproben- oder gepaarter t -Test
 - zwei Stichproben- t -Test mit Annahme gleicher Varianzen
 - Bericht: Welchs zwei Stichproben- t -Test

t -Statistik ohne Annahme gleicher Varianz

Es gibt auch eine Version des zwei-Stichproben- t -Tests, der die Annahme gleicher Varianzen nicht trifft (wir werden ihn im Verlauf der Vorlesung allerdings nicht verwenden):

Wäre eine beobachtete Abweichung $\bar{x} - \bar{y}$ mit der Nullhypothese verträglich, dass $\mu_X = \mu_Y$?

t -Statistik ohne Annahme gleicher Varianz

Es gibt auch eine Version des zwei-Stichproben- t -Tests, der die Annahme gleicher Varianzen nicht trifft (wir werden ihn im Verlauf der Vorlesung allerdings nicht verwenden):

Wäre eine beobachtete Abweichung $\bar{x} - \bar{y}$ mit der Nullhypothese verträglich, dass $\mu_X = \mu_Y$?

Wir schätzen die Streuung von $\bar{X} - \bar{Y}$ durch

$$\sqrt{\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}} \quad \text{und bilden} \quad T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}}}.$$

Unter $P_{(\mu_0, \mu_0, \sigma_1^2, \sigma_2^2)}$ ist T „approximativ Student-verteilt mit g Freiheitsgraden“

wobei g aus den Daten geschätzt wird, $g = \frac{\left(\frac{s_X^2}{n_X} + \frac{s_Y^2}{n_Y}\right)^2}{\frac{s_X^4}{n_X^2(n_X-1)} + \frac{s_Y^4}{n_Y^2(n_Y-1)}}$

Welchs* zwei Stichproben- t -Test

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}}}, \quad g = \frac{\left(\frac{s_X^2}{n_X} + \frac{s_Y^2}{n_Y}\right)^2}{\frac{s_X^4}{n_X^2(n_X-1)} + \frac{s_Y^4}{n_Y^2(n_Y-1)}}$$

Man verwirft die Nullhypothese „ $\mu_1 = \mu_2$ “ (zum Niveau α), wenn

$$pt(|t|, df=g, \text{lower.tail}=\text{FALSE}) \leq \alpha/2$$

ist, d.h. wenn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Student-verteilte Zufallsgröße mit g Freiheitsgraden einen betragsmäßig mindestens so großen Wert wie den beobachteten t -Wert annimmt, $\leq \alpha$ ist.

(Analoges Vorgehen für einseitige Tests)

*B. L. Welch, The Significance of the Difference between Two Means When the Population Variances Are Unequal,

Zwei-Stichproben- t -Test mit R:

```
> A <- md[Art=="africanum"]
> L <- md[Art=="libycum"]
> t.test(L,A)
```

Welch Two Sample t-test

data: L and A

$t = 3.2043$, $df = 54.975$, $p\text{-value} = 0.002255$

alternative hypothesis: true difference in mean
is not equal to 0

95 percent confidence interval:

0.9453745 4.1025338

sample estimates:

mean of x mean of y

28.43421 25.91026