


Hippolais polyglotta (Vieillot)

bearbeitet von

G. MAUERSBERGER



FUNDORTLISTE

1. Taddert	↓ Aa	CHAWORTH-MUSTERS 1939	— Gandria (Lugano)	As	HOFFMANN u. RIGGENBACH 1955
2. Rabat	Ac	HARTERT 1927a	19. San Cassiano (15. VII.)	As	GÉROUDET u. BARRUEL 1956
3. Gibraltar	Nc	IRBY 1895	20. Bozen	Nc	PARROT 1904
4. Lagos (VII)	A	v. JORDANS u. STEINBACHER 1941	21. Friaul	N	VALLON 1902
5. Lissabon (3. V.)	A	TICEHURST u. WHISTLER 1935	22. Podgacé (Lanišće)	A	RUCNER 1958
6. Santiago	As	TICEHURST u. WHISTLER 1928	23. Novi	↓ AJs	MADARÁSZ 1903
7. Pamplona	Ac	TICEHURST u. WHISTLER 1925	24. Bologna	A	STRESEMANN 1957a
8. Soulac-sur-Mer	A	STEINBACHER 1944	25. Prov. Pisa	Ba	CATERINI 1941
9. Martigné-Ferchand	As	DOUAUD 1948	26. Tivoli	A	STRESEMANN 1957a
10. St.-Lô	As	TROUCHE 1957	27. Calabrien	A	STRESEMANN 1957b
11. Haute Normandie	↓ Bsa	OLIVIER 1938	28. Taormina	As	KRAMPITZ 1956
12. Laon	A	JOUARD 1935	29. Monte Pellegrino	As	KRAMPITZ 1958
13. Vouziers	As	SUNKEL 1922	30. Tunis (s. nom. ictarina)	Bc	PAYN 1948
14. Haute Marne	A	JOUARD 1935	31. Gafsa	N	v. ERLANGER 1899
15. Dôle	As	BARRUEL 1950	32. Lambèse (5. V.)	A	HARTERT u. ROTHSCHILD 1912
16. Cize-Bolozon	As	GÉROUDET 1954	33. Dj. Amour	A	SNOW 1952
17. Frangy	As	GÉROUDET 1955	34. Dj. Aïssa	As	HARTERT u. ROTHSCHILD 1914
18. Val d'Aosta	As	MOLTONI 1943	35. Azilal	Ba	LYNES 1933
o Ascona	As	CORTI 1953	36. Étang de Biguglia	↓ Asa	MOUILLARD 1934

Anmerkungen

Zu P. 1:

Möglicherweise kommt auch diese Art in Westmarokko weit südlicher vor, als bisher angenommen wurde (vgl. *Emberiza cirius*, *Hippolais pallida*): VALVERDE (1957) traf sie am 21. V. bei Afum in Spanisch-Marokko, vielleicht betreffen auch die Beobachtungen HEIM DE BALSACS (1951) Ende Mai im Wadi Dra diese Art. Nach HARTERT (1927b) brüten die Orpheusspötter in Nordafrika meist schon ab Mitte Mai.

Zu P. 11:

BRICHE (1958) meldet ein Stück vom 7. IX. 58 aus Arras.

Zu P. 23:

Auch von RUCNER (1958) hier angetroffen; vgl. dessen Ausführungen. BRUSINA (1891) nennt ein Mitte Juni (spätestens 1890) bei Spica (= Spizza, S Budua) erlegtes ♂.

Zu P. 36:

Einziges brutverdächtiges Vorkommen (Mitte Juni mehrere singende ♂♂), das von den westmediterranen Inseln bekannt ist. MAYAUD (brfl. 1957) bezweifelt den Wert der Beobachtung, doch ist es wenig wahrscheinlich, daß *polyglotta* (Zugvogel!) passende Biotope auf den großen Inseln regelmäßig meiden sollte.

LITERATUR

- | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| BANNERMAN 1939 | Birds Trop. West Africa. London, 5, 36. | KRAMPTITZ 1958 | J. Orn. 99, 52. |
| BARRUEL 1950 | Alauda 17—18, 203. | LYNES 1920 | Ibis (11)2, 294. |
| BRICHE 1958 | Alauda 26, 231. | LYNES 1933 | Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 36, 43. |
| BRUSINA 1891 | Orn. Jb. 2, 13. | MADARÁSZ 1903 | Vögel Ungarns. Budapest, 483. |
| CATERINI 1941 | Riv. Ital. Orn. 11, 27. | MOLTONI 1943 | Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 82, 266. |
| CHAWORTH-MUSTERS 1939 | Ibis (14)3, 275. | MOUILLARD 1934 | Alauda 6, 200. |
| CORTI 1953 | Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 47—48, 15—40. | NIETHAMMER 1957 | Bonner Zool. Beitr. 8, 238. |
| DOUAUD 1948 | Alauda 16, 224. | OLIVIER 1938 | L'Oiseau 8, 208. |
| V. ERLANGER 1899 | J. Orn. 47, 254. | PARROT 1904 | Verh. Orn. Ges. Bayern 5, 31. |
| GÉROUDET 1954 | Alauda 22, 214. | PAYN 1948 | Ibis 90, 10. |
| GÉROUDET 1955 | Nos Oiseaux 23, 114. | RUCNER 1958 | J. Orn. 99, 363—366. |
| GÉROUDET u. BARRUEL 1956 | Nos Oiseaux 23, 283. | SNOW 1952 | Ibis 94, r491. |
| HARTERT 1927a | Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 16, 16. | STEINBACHER 1944 | Ber. Ve. Schles. Orn. 29, 25. |
| HARTERT 1927b | Beitr. Fortpfl.-Biol. Vögel 3, 89. | STRESEMANN 1957a | J. Orn. 98, 20. |
| HARTERT u. ROTHSCHILD 1912 | Novit. Zool. 18, 505. | STRESEMANN 1957b | J. Orn. 98, 383. |
| HARTERT u. ROTHSCHILD 1914 | Novit. Zool. 21, 196. | SUNKEL 1922 | Verh. Orn. Ges. Bayern 15, 115. |
| HEIM DE BALSAC 1951 | Alauda 19, 23. | TICEHURST u. WHISTLER 1925 | Ibis (12)1, 453. |
| HOFFMANN u. RIGGENBACH 1955 | Orn. Beob. 52, 13. | TICEHURST u. WHISTLER 1928 | Ibis (12)4, 675. |
| IRBY 1895 | Orn. Straits Gibraltar. London, 65. | TICEHURST u. WHISTLER 1935 | Ibis (13)5, 560. |
| V. JORDANS u. STEINBACHER 1941 | Ann. Nat.-Hist. Mus. Wien 52, 223. | TROUCHE 1957 | Alauda 25, 136. |
| JOUARD 1935 | Alauda 7, 90. | VALLON 1902 | Avicula 6, 8. |
| KRAMPTITZ 1956 | J. Orn. 97, 321. | VALVERDE 1957 | Aves Sahara Español. Madrid, 273. |

Briefliche Auskünfte erteilte KRONEISL (Kroatien); Überprüfung der Karte durch GÉROUDET (Schweiz) und MAYAUD (Frankreich).

Hippolais polyglotta (Vieillot)

Orpheusspötter

Verwandtschaft

Siehe *H. icterina*.

Zur Verbreitung

Das postglaziale Ausbreitungszentrum lag vermutlich im westlichen mediterranen Gebiet, weit südwestlich vom Ausbreitungszentrum von *H. icterina*.

Längs der dalmatinischen Küste ist *H. polyglotta* vielleicht weiter nach Süden verbreitet als bisher bekannt geworden ist. Spezialkarte der Verbreitung in Frankreich: JOUARD 1935, in Kroatien: RUCNER 1958.

Oekologie

Bevorzugt sonnige Lagen und bewohnt dort hohes dichtes Gebüsch, Buschwälder oder Hecken. Er verläßt oft den Schutz des Blattwerks, um sich frei auf einer Astspitze zu zeigen. In Europa vor allem in den warmen Niederungen bis 500 m, aber in der Sierra Nevada bei 2100 m (NIETHAMMER 1957); auch im Atlas-Gebirge in höheren Lagen: bei Azrou bis etwa 1400 m (LYNES 1920), bei Taddert bis 2000 m (CHAWORTH-MUSTERS 1939).

Neststand niedriger als bei *H. icterina*, meist 0,80 bis 1,70 m über dem Boden (JOUARD 1935).

Wanderungen

Zugvogel. Wintergebiet in den Savannenwäldern von West-Afrika, von Senegambien bis Nord-Kamerun (BANNERMAN 1939). Dorthin wandert *H. polyglotta* in breiter Front durch die westliche Sahara. Ankunft im Atlas-Gebirge (Azilal) bald nach Mitte April (LYNES 1933); bei Gibraltar frühestens 25. April (IRBY 1895); Abzug von den europäischen Brutplätzen Ende Juli bis September.