


Lanius nubicus Lichtenstein

bearbeitet von

G. MAUERSBERGER



FUNDORTLISTE

1. Valandova	As	STRESEMANN 1920	19. Judäische Berge	Na	PITMAN 1922
— Kaluckowa	AJs	STRESEMANN 1920, MAKATSCH 1950	— S Hebron	B	MENDELSSOHN brfl. 1958
2. Papapuli (S Platamon)	As	MAKATSCH 1950	20. Jaffa	As	SLADEN 1919
3. Lechonia	As	BANZHAF 1937	21. Nazareth	Na	ANTONIUS 1929
4. Stavros	As	MAKATSCH 1950	22. Ser Amadia	Nc	CHAPMAN u. MCGEOGH 1956
— Wrasma	Bs	MAKATSCH 1950	23. Diana (Rowanduz)	A	MOORE u. BOSWELL 1957
5. Thasos (VIII)	AJs	LYNES 1912, KATTINGER 1942	24. Choarta (NE Suleimaniya)	J	MOORE u. BOSWELL 1957
6. Samothraki	Ac	HARRISON u. PATEFF 1937	25. Durud (= Bahrein) (29. IV.)	As	Coll. Nat. Hist. Mus. Chicago (TRAYLOR brfl. 1958)
7. Alexandropolis (= Dedeagatsch)	Ac	HARRISON u. PATEFF 1937, MAKATSCH 1950	26. Pashmshurun (10. V.)	Aa	Coll. Amer. Mus. (VAURIE brfl. 1958), Coll. Nat. Hist. Mus. Chicago (TRAYLOR brfl. 1958)
— Makri-Distrikt	Ac	HARRISON u. PATEFF 1937, FLACH 1955	27. Basht	Jc	WITHERBY 1903
8. Mytilene	As	v. WETTSTEIN 1938	28. Naksh-i-Bahram (Nurabad)	Nc	WITHERBY 1903
9. Dikili	Aa	KUMERLOEVE 1957	29. Bikarz	As	CAPITO 1931
10. Savaştepe	As	KUMERLOEVE 1957	30. Amara	Ns	TICEHURST 1921
11. Smyrna (= Izmir)	Nc	KRÜPER 1869	31. Samara	B	WARD 1919 fide TICEHURST 1921
— Burnabat (= Bornova)	Na	SELOUS 1900	32. Mossul	A	SASSI 1912
12. Aidin	Na	SCHRADER 1891, VAURIE brfl. 1958			
13. Ankara	As	KUMERLÖWE u. NIETHAMMER 1935			
14. Mersina	A	SCHRADER 1891, HOLLÖM 1955			
15. Haruniye	Bsa	KUMERLOEVE brfl. 1957			
— Osmaniye	Bsa	KUMERLOEVE brfl. 1957			
16. Cypern	Nc	BUCKNILL 1909			
17. Libanon	B	MENDELSSOHN brfl. 1957			
— Beirut	Bsa	SCHRADER 1892			
18. Baniás (13. V.)	As	Coll. Amer. Mus. (VAURIE brfl. 1958)			
o Jericho	B	MENDELSSOHN brfl. 1958			

Anmerkung

Zu P. 20:

L. nubicus ist in Palästina häufiger als *L. senator*, da er auch die Kulturlandschaft (Oliven-, Obst- und Johannisbrotbaumpflanzungen) besiedelt. „In der Küstenebene breitet er sich mit der Besiedlung und Bepflanzung weiter nach Süden aus und brütet jetzt ca. 30 km südlich Tel-Aviv“ (MENDELSSOHN brfl. 1958; diese Angaben konnten auf der Karte nicht mehr berücksichtigt werden).

L I T E R A T U R

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ANTONIUS 1929 | Zool. Garten (NF) 2, 37. | MOORE u. BOSWELL 1957 | Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 12, 230. |
| BANNERMAN 1958 | Birds Cyprus. Edinburgh—London. 76. | PALUDAN 1936 | Vidensk. Medd. Dansk nat. hist. Foren. 100, 322. |
| BANZHAF 1937 | Verh. Orn. Ges. Bayern 21, 131. | PALUDAN 1938 | J. Orn. 86, 605. |
| BUCKNILL 1909 | Ibis (9) 3, 612. | PITMAN 1922 | Oolog. Rec. 2, 56. |
| BUTLER 1909 | Ibis (9) 3, 394. | REISER 1905 | Ornis Balcan. Wien. 3, 260. |
| CAPITO 1931 | J. Bombay Nat. Hist. Soc. 34, 925. | SASSI 1912 | Ann. Nat.-Hist. Mus. Wien 26, 117. |
| CHAPMAN u. MCGEOGH 1956 | Ibis 98, 593. | SCHRADER 1891 | Orn. Jb. 2, 187. |
| FLACH 1955 | Fauna och Flora 50, 207. | SCHRADER 1892 | Orn. Jb. 3, 13. |
| HARRISON u. PATEFF 1937 | Ibis (14) 1, 606. | SELOUS 1900 | Ibis (7) 6, 422. |
| HOLLOM 1955 | Ibis 97, 16. | SLADEN 1919 | Ibis (11) 1, 232. |
| KATTINGER 1942 | Verh. Orn. Ges. Bayern 22, 270. | STRESEMANN 1920 | Avif. Macedon. München. 112. |
| KRÜPER 1869 | J. Orn. 17, 30. | TICHHURST 1921 | J. Bombay Nat. Hist. Soc. 28, 235. |
| KUMMERLÖWE u. NIETHAMMER | J. Orn. 83, 25. | v. WETTSTEIN 1938 | J. Orn. 86, 19. |
| 1935 | | WITHERBY 1903 | Ibis (8) 3, 534. |
| KUMERLOEVE 1957 | Anz. Orn. Ges. Bayern 4, 716. | Briefliche Auskünfte erteilten KUMERLOEVE (Türkei), MENDELSSOHN (Palästina, Syrien), TRAYLOR und VAURIE (Vorderasien). | |
| LYNES 1912 | Ibis (9) 6, 146. | | |
| MAKATSCH 1950 | Vogelwelt Mazed. Leipzig. 166. | | |

Lanius nubicus Lichtenstein

Maskenwürger

Zur Verbreitung

Früher auch in der Gegend von Athen häufig, aber seit 1864 nicht mehr in Attika angetroffen (REISER 1905). Spezialkarte der Verbreitung in Griechenland: MAKATSCH (1950). Das häufige Vorkommen in Palästina (s. Anm. zu P. 20) und Persien veranlaßte uns, dort versuchsweise eine Grenzlinie zu ziehen, was an anderen Stellen (z. B. in Anatolien und Syrien) erst möglich werden wird, wenn diese Gebiete besser durchforscht sind.

Oekologie

In Südost-Europa und Vorder-Asien vor allem in der Küstenebene und in weiten Flußtälern; in SW-Persien dagegen in lichten Laubwäldern der Gebirge. Bevorzugt Baumgruppen (wie Maulbeer-Pflanzungen und alte Olivenhaine) des Kulturlandes oder lichtetes Gehölz. Bei Smyrna vor allem „in üppigen Weingärten mit uralten Ölbäumen sowie in den türkischen Friedhöfen, die dicht mit hohen Zypressen bepflanzt sind“ (KRÜPER 1869, p. 30). Im Libanon in offenem Buschwald aufwärts bis 800 m (MENDELSSOHN brfl. 1957). Im Zagross-Gebirge in lichtigem Eichenwald zwischen 1200 und 1800 m (PALUDAN 1938). Kommt, so wie seine Lebensstätten, in vielen Gegenden nur an weit verstreuten Stellen, dort aber häufig, vor.

Nest meist im mittleren Stockwerk höherer Bäume, mehr als 3 m über dem Boden.

Wanderungen

Zugvogel. Wintergebiet in baumreichen Gegenden von Eritrea, Abessinien und des Sudan, südwärts bis zum Rudolf-See, westwärts bis zum Tschad-See und sogar bis Zinder (PALUDAN 1936). Wandert dorthin in Menge über Palästina—Sinai—Aegypten und auch durch Irak—Arabien.

Ankunft am Brutplatz in Palästina schon von Mitte März, in Cypern von Ende März an (MENDELSSOHN brfl. 1957; BANNERMAN 1958), weiter nördlich in der 2. Hälfte April/Anfang Mai; Verbleib dort bis August/September oder gar Anfang Oktober. BUTLER (1909) traf den Maskenwürger bei Port Sudan sogar noch im Mai häufig an.