Mathematische Rechenmethoden

Version vom SS 2014*

Universität Mainz
Fachbereich 08
Theorie der kondensierten Materie
Prof. Dr. Friederike Schmid[†]

Mathematische Rechenmethoden für Physiker

Mathematische Rechenmethoden 1

Grundlegendes

Zahlen

Reelle Funktionen

Komplexe Zahlen

Vektorrechnung

Vektoren und Vektorräume

Skalarprodukt

Vektorprodukt

Infinitesimalrechnung

Folgen und Reihen

Differenzieren

Potenzreihen

Integrieren

Differentialgleichungen

Vektoranalysis **Zusatz für Studierende Bachelor of Science**

Die Delta-Funktion

Partielle Differentialgleichungen

*Elektronisch: Letzte Änderung am 11.07.2014

[†]03-534, Tel. (06131-)39-20365, <friederike.schmid@uni-mainz.de>

Literatur

K. Hefft Mathematischer Vorkurs

(online unter <http://www.thphys.uni-heidelberg.de/~hefft/vk1/>)

W. Nolting Theoretische Physik Bd. 1, erstes Kapitel

S. Großmann Mathematischer Einführungskurs für die Physik

K.-H. Goldhorn, H.-P. Heinz Mathematik für Physiker 1

C. Lang, N. Pucker Mathematische Methoden in der Physik

M. L. Boas Mathematical Methods in the Physical Sciences

WolframAlpha <http://www.wolframalpha.com/examples>

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegendes	1
1.1	Die Sprache der Physik	1
1.1.1	Zeichen für physikalische Größen	2
1.1.2	Zeichen für Verknüpfungen	3
1.1.3	Einheiten	4
1.2	Zahlen	6
1.2.1	Vorab: Mengen, Gruppen, Ringe, Körper	6
1.2.2	Natürliche Zahlen $\mathbb{N}$	7
1.2.3	Ganze Zahlen $\mathbb{Z}$	8
1.2.4	Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$	9
1.2.5	Reelle Zahlen $\mathbb{R}$	9
1.2.6	Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$	10
1.2.7	Zusammenfassung	11
1.3	Reelle Funktionen	12
1.3.1	Elementare Funktionen	12
1.3.1.1	Polynome und rationale Funktionen	12
1.3.1.2	Algebraische Funktionen	13
1.3.1.3	Exponentialfunktion	14
1.3.1.4	Logarithmus	15
1.3.1.5	Trigonometrische Funktionen	16
1.3.1.6	Hyperbolische Funktionen	16
1.3.1.7	Funktionen mit Ecken und Sprüngen	17
1.3.1.8	Weitere wichtige abgeleitete Funktionen	17
1.3.2	Eigenschaften von Funktionen	18
1.3.2.1	Spiegelsymmetrie	18
1.3.2.2	Beschränktheit	18
1.3.2.3	Monotonie	18
1.3.2.4	Eindeutigkeit	18
1.3.2.5	Stetigkeit	19
1.3.2.6	Grenzwerte	19

1.4	Komplexe Zahlen	21
1.4.1	Die imaginäre Einheit	21
1.4.2	Rechnen mit komplexen Zahlen	22
1.4.2.1	Rechnen mit der imaginären Einheit	22
1.4.2.2	Charakterisierung allgemeiner komplexer Zahlen:	22
1.4.2.3	Euler-Formel	23
1.4.2.4	Rechenregeln	23
1.4.2.5	Spezielle Transformationen	24
1.4.3	Funktionen einer komplexen Variablen	24
1.4.3.1	Potenzen	25
1.4.3.2	Wurzeln	25
1.4.3.3	Exponentialfunktion (natürlich)	26
1.4.3.4	Logarithmus (natürlich)	26
1.4.3.5	Trigonometrische Funktionen	27
2	Vektorrechnung	29
2.1	Vektoren	29
2.1.1	Definition bzw. Begriffsklärung	29
2.1.2	Koordinatensysteme und Koordinatendarstellung	30
2.1.3	Elementares Rechnen mit Vektoren, Vektorräume	31
2.2	Skalarprodukt (inneres Produkt)	33
2.2.1	Definition und mathematische Struktur	33
2.2.2	Koordinatendarstellung und Kronecker-Symbol	33
2.3	Vektorprodukt (äußeres Produkt, Kreuzprodukt)	35
2.3.1	Definition und mathematische Struktur	35
2.3.2	Koordinatendarstellung und Levi-Civita-Symbol	35
2.3.3	Höhere Vektorprodukte	36
3	Infinitesimalrechnung	39
3.1	Folgen und Reihen	39
3.1.1	Folgen	39
3.1.2	Reihen	40
3.2	Differentialrechnung	42
3.2.1	Die Ableitung	42
3.2.2	Elementare Beispiele	44
3.2.3	Differentiationsregeln	46
3.2.4	Anwendungen der Differentiationsregeln	47
3.2.5	Tabelle wichtiger Ableitungen	48
3.2.6	Vektorwertige Funktionen	49

3.2.6.1	Infinitesimalrechnung mit vektorwertigen Funktionen	49
3.2.6.2	Speziell Raumkurven	49
3.2.7	Extremwertaufgaben	51
3.3	Taylor-Entwicklung	55
3.3.1	Kurzer Abriss über Potenzreihen	55
3.3.2	Konstruktion der Taylor-Reihe	57
3.3.3	Anwendungen	59
3.4	Integralrechnung	62
3.4.1	Das Riemannsche Integral	62
3.4.2	Hauptsatz und Stammfunktion	63
3.4.3	Integrationsmethoden	65
3.4.4	Uneigentliche Integrale	68
3.4.5	Mehrfachintegrale	70
3.4.5.1	Beispiele	70
3.4.5.2	Polarkoordinaten	71
3.4.5.3	Wechsel der Integrationsvariablen und Jacobi-Determinante	73
4	Gewöhnliche Differentialgleichungen	77
4.1	Gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung	78
4.1.1	Separable Differentialgleichungen	78
4.1.2	Lineare Differentialgleichungen	79
4.2	Systeme von Differentialgleichungen	81
4.2.1	Differentialgleichungen höherer Ordnung versus Differentialgleichungssysteme erster Ordnung	81
4.2.2	Lineare Differentialgleichungssysteme	81
4.2.3	Speziell: Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten	82
4.2.4	Lineare Differentialgleichssysteme mit konstanten Koeffizienten	85
5	Vektoranalysis	87
5.1	Vorbemerkungen und Erinnerung	87
5.1.1	Physikalische Skalare, Vektoren und Tensoren	87
5.1.2	Felder	88
5.1.3	Kurvenintegral bzw. Linienintegral	88
5.1.4	Flächenintegral	89
5.2	Der Nabla-Operator	90
5.2.1	Skalare Felder und Gradient	90

5.2.2	Vektorfelder: Divergenz und Rotation	91
5.2.3	Der Laplace-Operator	91
5.2.4	Wichtige Zusammenhänge	92
5.3	Krummlinige Koordinaten	92
5.3.1	Allgemeine und orthogonale Koordinatensysteme	92
5.3.2	Darstellung in orthogonalen Koordinatensystemen	94
5.3.3	Zusammenstellung der Formeln für die wichtigsten Koordinatensysteme	96
5.4	Integralsätze	97
5.4.1	der Gaußsche Integralsatz	97
5.4.1.1	Der Satz	97
5.4.1.2	Folgerungen aus dem Gaußschen Integralsatz	98
5.4.2	Der Greensche Satz in der Ebene	99
5.4.3	Der Integralsatz von Stokes	100
6	Die Diracsche Delta-Funktion	103
6.1	Motivation und Einführung	103
6.2	Definition	104
6.3	Darstellungen der Delta-Funktion	104
6.3.1	Darstellung als Grenzwert glatter Funktionen	104
6.3.2	Darstellung als Integral	106
6.4	Rechenregeln mit der Delta-Funktion	106
6.5	Verallgemeinerung für höhere (d) Dimensionen	107
7	Die Fouriertransformation	109
7.1	Diskrete Fouriertransformation	110
7.1.1	Definition	110
7.1.2	Eigenschaften der diskreten Fouriertransformation	111
7.2	Fourierintegral	112
7.2.1	Definition	112
7.2.2	Eigenschaften und Rechenregeln	113
7.2.3	Paare von Fourier-Transformierten	114
7.2.4	Anwendungsbeispiele	116
7.2.4.1	Wellengleichung	116
7.2.4.2	Diffusionsgleichung	116
7.2.4.3	Greensche Funktion	116
7.3	Fourierreihe	118
7.3.1	Definition	118
7.3.2	Darstellung in trigonometrischen Funktionen	119

8	Partielle Differentialgleichungen	121
8.1	Übersicht über die wichtigsten Beispiele in der Physik	121
8.1.1	Elliptischer Typ	122
8.1.2	Hyperbolischer Typ	122
8.1.3	Parabolischer Typ	123
8.2	Lösungsverfahren für partielle Differentialgleichungen	123
8.2.1	Laplace-Gleichung	124
8.2.1.1	Numerische Lösung	124
8.2.1.2	Lösung mit Separation der Variablen	124
8.2.2	Wellengleichung	126
8.2.2.1	Freie Wellen: Lösung mittels Fouriertransformation	126
8.2.2.2	Schwingende Saite/Membran: Lösung mit Separationsansatz	127
8.2.3	Diffusionsgleichung	128
8.2.3.1	Separationsansatz und asymptotisches Verhalten	128
8.2.3.2	Propagatordarstellung	129
8.2.4	Inhomogene Gleichungen und Greens-Funktion	129
9	Orthogonale Funktionen	131
9.1	Allgemeiner Rahmen	131
9.1.1	Eigenwertgleichungen und Funktionensysteme	131
9.1.2	Das Sturm-Liouville-Problem	132
9.1.3	Beispiele für Sturm-Liouville-Gleichungen	133
9.2	Legendre-Polynome	134
9.2.1	Die einfache Legendresche Differentialgleichung	134
9.2.2	Wichtige Eigenschaften der Legendre-Polynome	135
9.2.3	Zugeordnete Legendre-Polynome	136
9.2.4	Kugelflächenfunktionen	137
9.3	Die Besselsche Differentialgleichung	139
A	Anhang: Matrizen	141
A.1	Beispiele von Matrizen	141
A.2	Elementare Begriffe	143
A.3	Rechnen mit Matrizen	143
A.4	Determinanten	145
A.5	Drehungen und Drehmatrizen	148
A.6	Das Eigenwertproblem	149
A.7	Funktionen von Matrizen	151

B Anhang: Analytische Funktionen	153
B.1 Definitionen	153
B.2 Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen	154
B.3 Integralsätze	155
B.4 Taylor-Reihe und Laurent-Reihe	156

Kapitel 2

Vektorrechnung

Logisch wäre es, in der Vorlesung an dieser Stelle mit Infinitesimalrechnung und Potenzreihen weiterzumachen (Kapitel 3). Es soll aber relativ unmotiviert ein Kapitel über Vektoren eingeschoben werden, da die elementaren Begriffe der Vektorrechnung in den Vorlesungen der Experimentalphysik so ziemlich von Anfang an benötigt werden.

2.1 Vektoren

2.1.1 Definition bzw. Begriffsklärung

Vektoren: Zentrale Größen in der Physik.

Aber: Was ist ein Vektor eigentlich?

→ physikalische und mathematische Sichtweise

Mathematischer Vektor: Element eines Vektorraums (siehe 2.1.3)

Physikalischer Vektor: Gerichtete Strecke mit Anfangs- und Endpunkt, z.B. Ort $\vec{r}$, Geschwindigkeit $\vec{v}$, Kraft $\vec{F}$.

Notation: $\vec{a}$, $\mathbf{a}$, $\underline{a}$, ...

Charakterisierung: Durch Betrag (Länge der Strecke) und Richtung (Einheitsvektor $\vec{e}_a$).

Skalare: Im Gegensatz zum Vektoren einfache "Zahlen"

Wieder physikalische und mathematische Sichtweise.

Mathematisch: Vektorraum ist "über einem Körper" definiert (siehe 2.1.3)
Skalare sind Elemente dieses Körpers.

Physikalisch: Größen, die durch einzelne Zahlen charakterisiert werden können (z.B. Temperatur, Druck, Betrag eines Vektors)

2.1.2 Koordinatensysteme und Koordinatendarstellung

Im allgemeinen legt man im Raum ein Koordinatensystem (KDS) fest.

Dann kann Vektor durch Satz von D Zahlen dargestellt werden. ($D = 3$ im Raum, $D = 2$ in der Ebene etc.) Zahlen (Koordinaten) hängen vom KDS ab.

⇒ Alternative Definition eines **physikalischen Vektors**:

Größe, charakterisiert durch D Zahlen (D : Dimension des Raums), die sich bei Drehung des Koordinatensystems in "bestimmter Weise" transformieren. (mehr dazu gleich).

Alternative Definition eines **physikalischen Skalars**:

Größe, charakterisiert durch eine Zahl, die vom Koordinatensystem unabhängig ist.

Frage: Was bedeutet "bestimmte Weise"?

Wie transformieren sich Vektorkoordinaten unter Drehung des KDS?
Annahme hier: rechtwinkliges Koordinatensystem.

Diskussion zunächst in 2 Dimensionen (Vektor in der Ebene)

Betrachte Einfluss auf Drehung um Winkel ψ auf Vektor $\vec{v}$.

Koordinaten des Vektor $\vec{v}$:
 $v_x = v \cos \phi \rightarrow v'_x = v \cos \phi'$
 $v_y = v \sin \phi \rightarrow v'_y = v \sin \phi'$
 mit $\phi' = \phi - \psi$

$$\Rightarrow \begin{aligned} v'_x &= v \cos(\phi - \psi) = v \cos \phi \cos \psi + v \sin \phi \sin \psi = v_x \cos \psi + v_y \sin \psi \\ v'_y &= v \sin(\phi - \psi) = v \sin \phi \cos \psi - v \cos \phi \sin \psi = -v_x \sin \psi + v_y \cos \psi \end{aligned}$$

$$\text{Matrix-Schreibweise: } \begin{pmatrix} v'_x \\ v'_y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix}}_{\text{Drehmatrix } \mathcal{D}(\psi)} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$$

→ Drehung des KDS kann durch **Drehmatrix** beschrieben werden.

Analog kann man Drehmatrizen auch in drei Dimensionen definieren.
(kompliziertere Form, die Matrizen hängen von drei Winkeln ab).

Vorteile der Beschreibung von Drehungen durch Drehmatrizen:

- Eine Drehmatrix beschreibt Einfluss der Drehung auf die Koordinaten aller Vektoren
- Kombinierte Drehungen können leicht durch Hintereinanderschalten von Drehmatrizen beschrieben werden (formal per Matrixmultiplikation – siehe Einschub Matrizen).

Kurzer Einschub Matrizen

(Stoff in 'Mathematik für Physiker' (für BSc) bzw. Rechenmethoden 2 (für BEd)
Für ausführlichere Übersicht siehe auch Anhang Matrizen)

Beispiel: 2×2 -Matrizen

Gegeben Matrix $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ und Vektoren $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$,

- Anwendung von Matrix auf Vektor: $w = Av$ bedeutet

$$\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 \end{pmatrix},$$

d.h. in Komponentenschreibweise: $w_j = \sum_k a_{jk}v_k$.

- Analog Matrixmultiplikation:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix},$$

d.h. in Komponentenschreibweise:

$$\text{Mit } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow C = AB$ bedeutet $c_{ik} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$.

Kann verallgemeinert werden auf beliebige $n \times n$ -Matrizen
(und sogar $n \times m$ Matrizen, ist aber hier weniger wichtig).

Matrixmultiplikation definiert assoziative Verknüpfung auf den Matrizen.
 $n \times n$ -Matrizen mit dieser Verknüpfung bilden eine Gruppe.

2.1.3 Elementares Rechnen mit Vektoren, Vektorräume

1) **Addition** von Vektoren $\vec{a} + \vec{b}$:

- Graphisch: Hänge Pfeile aneinander

- Koordinaten: $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$.

- Rechengesetze: Vektoren mit Addition bilden "Abelsche Gruppe"

(i) Abgeschlossen: $\vec{a} + \vec{b}$ ist wieder ein Vektor

(ii) Assoziativ: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

(iii) Es gibt eine Null $\vec{0}$ mit: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a} \quad \forall \vec{a}$

(iv) Inverses: $\forall \vec{a} \quad \exists (-\vec{a}) : \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{a} - \vec{a} = \vec{0}$.

(v) Kommutativ: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

2) **Multiplikation mit einem Skalar** : (i.e., einer Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$.)

- Graphisch: Streckung/Stauchung um Faktor λ
(Falls $\lambda < 0$: Richtung dreht sich um.)

- Koordinaten: $\lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \lambda a_3 \end{pmatrix}$.
- Rechengesetze:
 - (vi) Kommutativ: $\lambda \vec{a} = \vec{a} \lambda$
 - (vii) Assoziativ: $\beta(\alpha \vec{a}) = (\beta \alpha) \vec{a}$
 - (viii) Distributivgesetze: $(\alpha + \beta) \vec{a} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{a}$, $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha \vec{a} + \alpha \vec{b}$.

Bemerkung: Die Menge der Skalare $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ für sich genommen bildet einen Körper (siehe 1.2.1). Eine Menge von Objekten, auf der eine Addition und eine Skalarmultiplikation mit den obigen Eigenschaften (i)-(viii) definiert ist bezeichnet man als linearen Vektorraum über dem Körper der Skalare.

⇒ Mathematische Definition eines Vektors: Element eines Vektorraums
 Der mathematische Begriff des Vektors ist allgemeiner als der physikalische Begriff. In dieser Vorlesung werden mathematisch gesehen meistens Vektorräume $\mathbb{R}^D$ diskutiert (D ist die Raumdimension). Aber z.B. die Menge der Funktionen $f(x)$ bildet auch einen Vektorraum über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$.

3) Lineare Abhängigkeit :

Definition: Vektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ heißen **linear unabhängig**, falls aus $\sum \alpha_i \vec{a}_i = 0$ folgt $\alpha_i = 0 \quad \forall \quad i$.

Anderenfalls sind die Vektoren **linear abhängig**.

Anschaulich: Zwei Vektoren linear abhängig ⇒ parallel.

Drei Vektoren linear abhängig ⇒ koplanar (in einer Ebene) .

Bemerkungen:

- Zwei linear unabhängige Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ spannen Ebene durch Ursprung auf, d.h. alle Punkte der Ebene können in die Form $\alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$ gebracht werden (α, β sind Skalare).
- Drei linear unabhängige Vektoren spannen gesamten Raum auf.
- In drei Dimensionen sind maximal drei Vektoren linear unabhängig. (Mathematisch: Dimension ist definiert als die maximale Anzahl linear unabhängiger Vektoren in einem Vektorraum)

Aufgaben:

- Gegeben sei $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Berechnen Sie $\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} - \vec{c}$.

Sind $(\vec{a}, \vec{b}), (\vec{a}, \vec{c}), (\vec{b}, \vec{c}), (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$, linear unabhängig?

Wie lautet die Gleichung für die Gerade durch $\vec{a}$, die zu $\vec{b}$ parallel ist?

- Bilden Sie in der (x, y) Ebene die Summe von 7 Vektoren der Länge a , wobei $\vec{a}_1$ in x -Richtung zeigt und $\vec{a}_j$ mit $\vec{a}_{j-1}$ die Winkeldifferenz $\pi/6$ hat.

2.2 Skalarprodukt (inneres Produkt)

2.2.1 Definition und mathematische Struktur

1) Skalarprodukt im Vektorraum $\mathbb{R}^3$ (oder $\mathbb{R}^D$ mit beliebigem $D \geq 1$):

Abbildung eines Paares von Vektoren auf einen Skalar

$$\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = a b \cos(\phi)}$$
 mit ϕ : Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Physikalisches Beispiel: Arbeit = Kraft mal Weg ($W = \vec{F} \cdot \vec{\Delta r}$).

2) Rechenregeln:

- (i) Kommutativ: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- (ii) Homogen: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$
- (iii) Distributivgesetz: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.
- (iv) $\vec{a} \cdot \vec{a} = a^2 \geq 0$
($a = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$ ist Betrag des Vektors).

- Kein eindeutiges Inverses
(durch Vektoren darf man nicht dividieren !)

Bemerkung: Einen Vektorraum mit einem Skalarprodukt, das die Eigenschaften (i)-(iv) erfüllt, nennt man **unitär**.

3) Folgerungen

- **Cauchy-Schwartzsche Ungleichung**: $\boxed{|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq ab}$

(hier konkret: klar, da $\cos \phi \leq 1$

Kann man aber auch allein aus (i)-(iv) beweisen:

$$\text{Für alle } \lambda \text{ gilt: } 0 \leq (\vec{a} - \lambda \vec{b})^2 = a^2 + \lambda^2 b^2 - 2\lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\text{Wähle } \lambda = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{b^2} \Rightarrow 0 \leq a^2 - \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{b^2} \Rightarrow (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq a^2 b^2 \quad \checkmark$$

Falls $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = ab$ folgt: Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ sind parallel.

(möglicher Test auf lineare Abhängigkeit).

- **Dreiecks-Ungleichung**: $\boxed{|a - b| \leq |\vec{a} - \vec{b}| \leq a + b}$

$$\text{vgl. } \left\{ \begin{array}{l} (a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \\ (\vec{a} + \vec{b})^2 = a^2 + b^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} \\ (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Aus } -ab \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq ab \\ \text{(Cauchy-Schwartzsche Ungl.)} \\ \text{folgt } (a - b)^2 \leq (\vec{a} + \vec{b})^2 \leq (a + b)^2 \quad \checkmark \end{array}$$

- **Einheitsvektor** in Richtung $\vec{a}$: $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{a} = \frac{\vec{a}}{\sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}}$

2.2.2 Koordinatendarstellung und Kronecker-Symbol

Ab jetzt sollen unsere Koordinatensysteme rechtwinklige Koordinatenachsen haben, die ein "Rechtssystem" bilden (Rechte-Hand Regel).

Definiere $\vec{e}_i$: Einheitsvektoren entlang der Koordinatenachse i .

$\rightarrow \vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3 = \sum_i a_i \vec{e}_i$ (mit a_i : Koordinaten)

$$\text{Es gilt: } \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

1) Motiviert Definition des **Kronecker-Symbols**

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$$

2) Skalarprodukt in Koordinatendarstellung: $\vec{a} = \sum_i a_i \vec{e}_i$; $\vec{b} = \sum_j b_j \vec{e}_j$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = (\sum_i a_i \vec{e}_i) \cdot (\sum_j b_j \vec{e}_j) = \sum_{ij} a_i b_j (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j) = \sum_{ij} a_i b_j \delta_{ij}$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_i a_i b_i$$

3) Anwendung: Berechnung der Koordinaten eines Vektors $\vec{a}$ in einem anderen (rechtwinkligen) Koordinatensystem mit Koordinatenachsen in Richtung $\{\vec{e}'_i\}$.

Koordinaten: Projektion von $\vec{a}$ auf die Achsen (Einheitsvektoren) $\vec{e}'_i$:

$$\Rightarrow a'_i = \vec{a} \cdot \vec{e}'_i \Rightarrow \vec{a} = \sum_i a'_i \vec{e}'_i = \sum_i (\vec{a} \cdot \vec{e}'_i) \vec{e}'_i.$$

Gilt für alle Vektoren $\vec{a}$ und rechtwinklige Koordinatensysteme $\{\vec{e}'_i\}$.

↪ Liefert einfache Berechnungsformel für Drehmatrizen.

Betrachte Drehung, die KDS $\{\vec{e}_i\}$ in KDS $\{\vec{e}'_i\}$ überführt.

Vektor $\vec{a}$ hat Koordinaten a_i bzw. a'_i mit $a_i = \vec{a} \cdot \vec{e}_i$, $a'_i = \vec{a} \cdot \vec{e}'_i$

Aus $\vec{a} = \sum_j a_j \vec{e}_j$ und $a'_i = \vec{a} \cdot \vec{e}'_i$ folgt $a'_i = \sum_j a_j (\vec{e}_j \cdot \vec{e}'_i)$

also $a'_i = \sum_j \mathcal{D}_{ij} a_j$ mit Drehmatrix $\mathcal{D}_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}'_j$

Aufgaben:

- Beweisen Sie den Kosinussatz für Dreiecke: Für Dreiecke mit Seitenlängen a, b, c und dem Winkel ϕ zwischen den Seiten a und b gilt $a^2 + b^2 - 2ab \cos \phi = c^2$.
- Betrachten Sie Vektoren mit Koordinaten $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- Bestimmen Sie den Einheitsvektor in Richtung $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

2.3 Vektorprodukt (äußeres Produkt, Kreuzprodukt)

2.3.1 Definition und mathematische Struktur

1) Vektorprodukt im Vektorraum $\mathbb{R}^3$:

Abbildung eines Paares von Vektoren auf Vektor $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$

mit Betrag $|\vec{c}| = a b \sin(\phi)$ (ϕ : Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$.)

Richtung: $\vec{c}$ senkrecht auf $\vec{a}$, $\vec{b}$

Vorzeichen: So, dass $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ Rechtssystem.

Geometrisch: $|\vec{c}|$ ist Fläche des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms

Physikalisches Beispiel: Drehimpuls $\vec{r} \times \vec{p}$.

2) Rechengesetze

(i) Antikommutativ: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

(ii) Homogen: $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$.

(iii) Distributivgesetz: $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

(zur Herleitung siehe z.B. Nolting Bd. 1)

NB: Aus (i) und (iii) folgt auch $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$

(iv) Jacobi-Identität $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$
(vorläufig ohne Herleitung).

- Nicht assoziativ, keine Identität, kein Inverses
(durch Vektoren kann man immer noch nicht dividieren).

Bemerkung: Einen Vektorraum mit einem äußeren Produkt, das die Eigenschaften (i)-(iv) erfüllt, nennt man eine **Lie Algebra**.

2.3.2 Koordinatendarstellung und Levi-Civita-Symbol

Das Koordinatensystem sei wieder ein rechtwinkliges Rechtssystem, mit Einheitsvektoren $\vec{e}_i$ entlang den Koordinatenachsen.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 &= \vec{e}_3 &= -\vec{e}_2 \times \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 &= \vec{e}_1 &= -\vec{e}_3 \times \vec{e}_2 & \quad \vec{e}_i \times \vec{e}_i = 0 \quad \forall i. \\ \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 &= \vec{e}_2 &= -\vec{e}_1 \times \vec{e}_3 \end{aligned}$$

1) Motiviert Definition des Epsilon-Tensor oder Levi-Civita-Symbol:

$$\epsilon_{ijk} := \begin{cases} 1 & : (ijk) = (123), (231), (312) \\ -1 & : (ijk) = (213), (321), (132) \\ 0 & : \text{sonst} \end{cases} = (\vec{e}_i \times \vec{e}_j) \cdot \vec{e}_k$$

(bzw. "total antisymmetrischer Tensor dritter Stufe").

2) Vektorprodukt in Koordinatendarstellung:

$$\text{Mit } \vec{a} = \sum_i a_i \vec{e}_i; \quad \vec{b} = \sum_j b_j \vec{e}_j \text{ folgt } \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \sum_{ij} a_i b_j (\vec{e}_i \times \vec{e}_j)$$

$$\Rightarrow c_k = \vec{c} \cdot \vec{e}_k = [\vec{a} \times \vec{b}]_k = \sum_{ij} a_i b_j (\vec{e}_i \times \vec{e}_j) \cdot \vec{e}_k = \sum_{ij} a_i b_j \epsilon_{ijk}$$

$$\Rightarrow \boxed{[\vec{a} \times \vec{b}]_k = \sum_{ij} a_i b_j \epsilon_{ijk}}, \quad \text{konkret: } \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

3) Rechenregeln mit dem Epsilon-Tensor:

$$\boxed{\epsilon_{ijk} = \underbrace{\epsilon_{jki} = \epsilon_{kij}}_{\text{gerade Permutationen}} = \underbrace{-\epsilon_{jik} = -\epsilon{kji} = -\epsilon_{ikj}}_{\text{ungerade Permutationen von } (i, j, k)}}$$

$$\boxed{\sum_m \epsilon_{klm} \epsilon_{pqm} = \delta_{kp} \delta_{lq} - \delta_{kq} \delta_{lp}}$$

(Beweis: Hausaufgabe – Buchhaltung, argumentieren ...)

$$\boxed{\sum_{lm} \epsilon_{klm} \epsilon_{plm} = 2\delta_{kp}}$$

(denn: $\sum_{lm} \epsilon_{klm} \epsilon_{plm} = \sum_l (\delta_{kp} \underbrace{\delta_{ll}}_1 - \delta_{kq} \delta_{lp}) = 3\delta_{kp} - \delta_{kp} \checkmark$)

Aufgaben:

- Berechnen Sie $\vec{a} \times \vec{b}$ mit $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.
- Berechnen Sie die Fläche des von $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ aufgespannten Parallelogramms.

2.3.3 **Höhere Vektorprodukte**1) **Spatprodukt** $\boxed{(\vec{a}\vec{b}\vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})}$ ($\rightarrow$ Skalar)

Geometrische Interpretation:

Betrag: Volumen eines von $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ aufgespannten Parallelepipeds.

Vorzeichen: +, falls $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ Rechtssystem,

– für Linkssystem.

Koordinatenschreibweise:

$$(\vec{a}\vec{b}\vec{c}) = \sum_k a_k (\vec{b} \times \vec{c})_k = \sum_{ijk} a_k b_i c_j \epsilon_{ijk} = \sum_{ijk} \epsilon_{ijk} a_i b_j c_k$$

$$\Rightarrow \boxed{(\vec{a}\vec{b}\vec{c}) = \sum_{ijk} \epsilon_{ijk} a_i b_j c_k}.$$

2) **Doppeltes Vektorprodukt:** $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ ($\rightarrow$ Vektor)

Dafür gilt "Entwicklungssatz": $\boxed{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})}$

(Herleitung am schnellsten mit Hilfe des Epsilon-Tensors:

$$\begin{aligned} (\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}))_k &= \sum_{ij} \epsilon_{ijk} a_i (\vec{b} \times \vec{c})_j = \sum_{ij} \epsilon_{ijk} a_i \sum_{lm} \epsilon_{lmj} b_l c_m \\ &= \sum_{ijlm} \epsilon_{ijk} \epsilon_{lmj} a_i b_l c_m = \sum_{ilm} (\sum_j \epsilon_{kij} \epsilon_{lmj}) a_i b_l c_m \\ &= \sum_{ilm} (\delta_{kl} \delta_{im} - \delta_{km} \delta_{il}) a_i b_l c_m \\ &= \sum_m a_m b_k c_m - \sum_l a_l b_l c_k = b_k (\vec{a} \cdot \vec{c}) - c_k (\vec{a} \cdot \vec{b}) \quad). \end{aligned}$$

3) Weitere wichtige Beziehungen:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$$

$$(\vec{a} \times \vec{b})^2 = a^2 b^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \quad (\text{Lagrange-Identität})$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{c}\vec{d}\vec{a})\vec{b} - (\vec{c}\vec{d}\vec{b})\vec{a} = (\vec{a}\vec{b}\vec{d})\vec{c} - (\vec{a}\vec{b}\vec{c})\vec{d}$$

Aufgaben:

- Beweisen Sie die Jacobi-Identität

- Gegeben die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Berechnen Sie $(\vec{a}\vec{b}\vec{c})$, $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|$, $|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})|$, $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c})$.

- Beweisen Sie mit Hilfe des Levi-Civita-Symbols: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$

- Berechnen Sie $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{a} \times \vec{d}) + (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot (\vec{b} \times \vec{d})$.

- Die Vektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ seien linear unabhängig.

Die reziproken Vektoren seien definiert durch: $\vec{b}_1 = \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{(\vec{a}_1 \vec{a}_2 \vec{a}_3)}$, $\vec{b}_2 = \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{(\vec{a}_1 \vec{a}_2 \vec{a}_3)}$, $\vec{b}_3 = \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{(\vec{a}_1 \vec{a}_2 \vec{a}_3)}$.

Zeigen Sie $\vec{a}_i \vec{b}_j = \delta_{ij}$

- Zeigen Sie $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot ((\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}) = 2\vec{a}(\vec{b} \times \vec{c})$.